



Liotondol 2,5% GEL

PRIMA DELL'USO LEGGETE CON ATTENZIONE
TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Che cos'è

Liotondol 2,5% gel è un antiinfiammatorio ed antireumatico.

Perché si usa

Liotondol 2,5% gel si usa per il trattamento locale di stati dolorosi ed infiammatori di natura reumatica o traumatica delle articolazioni e dei muscoli, come in caso di contusioni, distorsioni, strappi muscolari, ecc.

Quando non deve essere usato

Liotondol 2,5% gel non deve essere utilizzato in caso di ipersensibilità al principio attivo, ad uno qualsiasi degli eccipienti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico, quali acido acetilsalicilico o altri antiinfiammatori

non steroidei e fenofibrato, o a un prodotto solare. Generalmente controindicato in gravidanza e durante l'allattamento.

Durante il trattamento e nelle due settimane successive non esporsi al sole (anche quando il cielo è velato) compreso il solarium.

Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico

Gravidanza (vedere: Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento). Bambini (vedere: È importante sapere che). È opportuno consultare il medico anche nei casi in cui tali disturbi si fossero manifestati in passato.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

In gravidanza e durante l'allattamento, Liotondol 2,5% gel deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso. Consultate il medico nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una maternità.

Precauzioni per l'uso

È opportuno evitare l'applicazione di Liotondol 2,5% gel in corrispondenza di ferite aperte o lesioni della cute. Il gel non deve venire in contatto con le mucose degli occhi.

L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione o irritazione locale. In tal caso è necessario interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una terapia idonea. Dopo un breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico.

Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica. Sono improbabili interazioni con altri farmaci poiché le concentrazioni nel siero dopo somministrazione topica sono basse. È però opportuno monitorare i pazienti in trattamento con cumarinici. Se state usando altri medicinali, chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

E' importante sapere che

Nei bambini, Liotondol 2,5% gel deve essere usato solo dopo aver consultato il medico.

L'esposizione alla luce solare diretta (anche quando il cielo è velato), compreso il solarium, delle zone trattate con il farmaco può provocare reazioni cutanee più o meno gravi definite come reazioni di fotosensibilizzazione.

Inoltre è necessario:

- proteggere dal sole le parti trattate con adeguati indumenti durante tutta la durata del trattamento e le due settimane successive

- procedere ad un accurato e prolungato lavaggio delle mani dopo ogni uso del farmaco al fine di evitare qualsiasi contatto accidentale con le zone che possono essere esposte al sole.

Non utilizzare bendaggi occlusivi (striscia di garza, o di altro materiale usato, che aumenta ancora di più l'assorbimento percutaneo).

Note di educazione sanitaria

Si raccomanda di lavare le mani dopo l'applicazione.

Come usare questo medicinale

Quanto

Applicare sulla cute uno strato sottile di gel massaggiando delicatamente.

Quando e per quanto tempo

1 o 2 volte al giorno,

Attenzione: non superare il numero di applicazioni indicate senza il consiglio del medico.

Dopo breve periodo di trattamento, senza risultati apprezzabili, consultare il medico. Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue





caratteristiche.

Come

Applicare in strato sottile, massaggiando delicatamente. Lavarsi accuratamente e in maniera prolungata le mani dopo ogni uso.

Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale

È improbabile un sovradosaggio per somministrazione topica. In caso di ingestione accidentale, il gel può causare effetti collaterali sistemici secondo la quantità ingerita. Tuttavia, nel caso in cui ciò avvenga, il trattamento sarà di tipo sintomatico e di supporto come nei casi di sovradosaggio di antiflogistici per uso orale.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Liotondol avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Cosa fare se avete dimenticato di prendere una o più dosi

Continuare la terapia come da posologia consigliata.

dovuti alla sospensione del trattamento

Effetti

Nessun effetto.

Effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, Liotondol può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestano. Come per gli altri medicinali per uso cutaneo possono verificarsi effetti indesiderati a carico della pelle. Sono state segnalate reazioni cutanee localizzate che potrebbero successivamente estendersi oltre la zona di applicazione e, in alcuni casi, essere gravi e generalizzate.

La frequenza e l'entità di tali effetti risultano sensibilmente ridotte evitando l'esposizione al sole, compreso il solarium, durante il trattamento e nelle due settimane successive.

Eritema, bruciore, prurito, reazioni cutanee di tipo allergico, dermatiti, eczemi da contatto, reazioni da fotosensibilizzazione, orticaria, eruzioni bollose.

Di norma, la quota di principio attivo assorbita attraverso la cute non raggiunge, in circolo, concentrazioni tali da rendere valide le avvertenze e da esporre ai rischi di effetti indesiderati relativi alla somministrazione del farmaco per via orale. Sono stati riportati anche isolati casi di reazioni avverse di tipo sistemico come disturbi renali. Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

Scadenza e Conservazione

Scadenza: vedere la data di scadenza indicata sulla confezione.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Dopo prima apertura il prodotto può essere conservato per un periodo massimo di 7 mesi con condizioni di conservazione al di sotto dei 25°C. L'utilizzatore è responsabile della conservazione del prodotto dopo prima apertura, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni di conservazione indicate.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Composizione

100 g di gel contengono:

Principio attivo: ketoprofene 2,5 g

Eccipienti: trolamina, carbomeri, etanolo 96%, essenza di lavanda, acqua depurata.

Come si presenta

Liotondol 2,5% gel si presenta in forma di gel.

Il contenuto della confezione è un tubo da 50 g.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Sanofi-aventis S.p.A. Viale L. Bodio 37/B - 20158 Milano (Italia)

Produttore

Sanofi-Aventis (Waterford) Ltd. IDA Industrial Park, Waterford, Irlanda oppure Sanofi Winthrop Industrie, 196, rue du Maréchal Juin, F-45200 Amilly, Francia

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

Revisione del Foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco: Luglio 2009